

## Morus bombycis



7 x 5 m. Considéré maintenant comme synonyme de *M. alba*, espèce elle-même reconnue comme très variable. Cime étalée, large. Croissance modérée. Feuilles trilobées, amples, vert intense brillant, jaune d'or en automne. Sa fructification est de peu d'intérêt mais il est incomparable pour réaliser des zones d'ombre.

### Taxonomie

<b>Nom français :</b>	Mûrier blanc <i>Macrophylla</i> , Mûrier <i>Kagayamae</i> des pépiniéristes, Mûrier à feuille de platane, Mûrier à feuilles de platane
<b>Synonymes des noms latins :</b>	<i>Morus kagayamae</i>
<b>Famille botanique :</b>	Moraceae

### Agronomie

<b>Exposition :</b>	plein soleil
<b>Nature du sol :</b>	argilo-sableuse, caillouteuse, limoneuse, limono-sableuse, sableuse
<b>Richesse en matière organique :</b>	faible, normale
<b>Humidité du sol :</b>	sec, très sec, frais
<b>pH du sol :</b>	neutre, basique, très basique
<b>Rusticité :</b>	rustique
<b>Milieus :</b>	prairie sèche, talus
<b>Capacités de drainage du sol :</b>	bien drainé, filtrant
<b>Tolérance au calcaire actif :</b>	calcicole

### Divers

<b>Usages possibles :</b>	comestibles
---------------------------	-------------

### Feuillage

<b>Type de feuillage :</b>	caduc
----------------------------	-------

### Fleurs

<b>Période de floraison :</b>	05-mai, 06-juin
-------------------------------	-----------------