

Acer campestre



Arbre 15x6 m. Vigueur et développement variable selon les conditions de sol. Couronne arrondie ou ovoïde, dense, très ramifiée. Écorce brun jaunâtre, sillonnée. Feuilles à 3-5 lobes, rougeâtres à la naissance puis vert foncé, jaunes ou cuivrées en automne. Floraison vert jaunâtre en avril-mai. Fruits rouge brun. Très tolérant quant aux conditions de sol de sec à humide, de faiblement acide à alcalin. Supporte le calcaire. Émondage de temps en temps. Supporte les tailles sévères. Résiste à des ambiances difficiles, comme les inondations temporaires, le salage. Bon comportement au vent, au froid et en climat urbain. Efficace en haies libres ou taillées et brise-vents.

Taxonomie

Nom français : Azeraille, Bois de poule, Bois-chaud, Petit érable, Érable, Erable champêtre, Acéaille, Auzerolle
Famille botanique : Sapindaceae

Agronomie

Type de sol : neutre
Exposition : plein soleil, soleil, mi-ombre
Nature du sol : argileuse, argilo-limoneuse, argilo-sableuse, caillouteuse, limoneuse
Richesse en matière organique : faible, normale, riche
Humidité du sol : frais, sec, humide
pH du sol : acide, neutre, basique, très basique
Rusticité : très rustique
Milieus : lisière fraîche, lisière sèche, prairie fraîche, sous-bois frais, talus
Capacités de drainage du sol : bien drainé, filtrant, normal
Tolérance au calcaire actif : calcicole

Divers

Particularités : fruits décoratifs
Usages possibles : haies
Saisons d'intérêt : printemps, été, automne

Feuillage

Couleur des feuilles : vert foncé
Type de feuillage : caduc
Couleur automnale des feuilles : jaune, orange

Fleurs

Couleur des fleurs : jaune
Période de floraison : 04-avril, 05-mai

Morphologie

Hauteur : 15m
Largeur : 6m
Port : couronne arrondie

Racines

Système racinaire : en cœur

Divers

Indigène : oui