

Frangula alnus 'Aspenifolia'



Feuille vert fine et longue donnant une jolie silhouette vaporeuse à l'arbuste.

Taxonomie

Nom français : Bourdaine à feuilles laciniées, Bourdaine à feuilles d'asplénium
Famille botanique : Rhamnaceae

Conseils

Période de taille : 06-juin

Agronomie

Type de sol : acide
Exposition : plein soleil, soleil, mi-ombre
Nature du sol : argileuse, argilo-limoneuse, argilo-sableuse, limoneuse, limono-sableuse
Richesse en matière organique : riche, normale
Humidité du sol : frais, humide, très humide
pH du sol : acide, neutre, basique
Rusticité : très rustique
Milieus : lisière fraîche, lisière humide, prairie fraîche, prairie humide
Capacités de drainage du sol : lourd, normal, bien drainé
Tolérance au calcaire actif : tolérante

Divers

Usages possibles : fruits décoratifs, berges

Feuillage

Couleur des feuilles : vert foncé
Type de feuillage : caduc

Fleurs

Couleur des fleurs : vert
Période de floraison : 04-avril, 05-mai, 06-juin

Morphologie

Hauteur : 2,5m
Largeur : 2m
Vitesse de croissance : moyenne
Port : fastigié

