

Cotoneaster procumbens 'Streib's Findling'



0,15x0,50 m. Persistant. Feuilles alternes distiques ovales, vert foncé brillant. Fleurs très mellifères blanc rosé en mai-juin. Fruits rouge corail à partir de septembre et jusqu'à l'hiver. Accepte tout terrain même calcaire. Excellent pour fixer la terre des talus, les rameaux s'enracinant dans le sol. Très bon couvre-sol. Rocaille, bac. Toute exposition.

Taxonomie

Nom français :	Cotonéaster rampant Streibs Findling
Famille botanique :	Rosaceae
Obtenteur :	Bofinger (DE)
Année d'obtention :	1960

Conseils

Période de taille :	03-mars
---------------------	---------

Agronomie

Type de sol :	ordinaire
Exposition :	plein soleil, soleil, mi-ombre
Nature du sol :	ordinaire
Humidité du sol :	frais
pH du sol :	neutre
Rusticité :	très rustique

Divers

Usages possibles :	couvre-sol, fruits décoratifs, potées
--------------------	---------------------------------------

Feuillage

Couleur des feuilles :	vert foncé
Type de feuillage :	persistant

Fleurs

Couleur des fleurs :	blanc
Période de floraison :	05-mai, 06-juin

Fruits

Couleur des fruits :	rouge
----------------------	-------

Morphologie

Hauteur :	0,1m
Port :	tapissant

Racines

Système racinaire :	étalé
---------------------	-------

