

Buddleja alternifolia



3,50 m. Buisson touffu. Ses branches souples et retombantes lui confèrent un port très gracieux. Feuilles lancéolées, étroites, vert grisâtre. Fleurs lilacées, odorantes, groupées en petits bouquets très nombreux qui forment une sorte de long épi retombant. Sol sain, nutritif, acide ou alcalin. Supporte bien la sécheresse et les climats urbains. Isolé, groupe, garniture de talus, bac, jardin sur dalle, palissage sur les murs ensoleillés.

Taxonomie

Nom français : Arbre aux papillons à feuilles alternes, Budléia alterne
Famille botanique : Scrophulariaceae

Conseils

Période de taille : 03-mars

Agronomie

Type de sol : ordinaire
Climat : continental
Exposition : plein soleil, soleil
Nature du sol : argilo-limoneuse, argilo-sableuse, caillouteuse, limoneuse, limono-sableuse, ordinaire, sableuse
Richesse en matière organique : faible, normale
Humidité du sol : sec, très sec
pH du sol : acide, neutre, basique, très basique
Rusticité : très rustique
Milieus : lisière sèche, prairie sèche, talus
Capacités de drainage du sol : bien drainé, filtrant
Tolérance au calcaire actif : calcicole

Divers

Usages possibles : haies, talus

Feuillage

Couleur des feuilles : vert
Type de feuillage : caduc

Fleurs

Couleur des fleurs : bleu
Période de floraison : 05-mai, 06-juin, 07-juillet

Morphologie

Hauteur : 3m
Port : arrondi

Racines

Système racinaire : superficiel

© Tous droits réservés. Données fournies par Plandanjou avec la collaboration de Plante et Cité. Document généré le 28/04/2026 21:15:53
PLANDANJOU SA · 10 esplanade Jean Sauvage 49130 LES PONTS-DE-CÉ (FRANCE) · Tél. +33 2 41 79 44 80 · info@plandanjou.com · www.plandanjou.com
RCS Angers B 310 679 311