

Acer palmatum 'Bloodgood'



Arbuste 3x3 m. Feuillage rouge pourpre foncé à rouge noir perdurant jusqu'en fin d'été, rouge écarlate à l'automne. Fruits rouges.

Taxonomie

Nom français :	Erable japonais Bloodgood, Érable
Famille botanique :	Sapindaceae
Obtenteur :	Bloodgood Nurseries (US)
Année d'obtention :	1940

Agronomie

Type de sol :	acide
Climat :	continental
Exposition :	soleil, mi-ombre
Nature du sol :	argileuse, argilo-limoneuse, argilo-sableuse, limoneuse, limono-sableuse
Richesse en matière organique :	riche, très riche
Humidité du sol :	frais
pH du sol :	acide, neutre
Rusticité :	très rustique
Milieus :	berges, sous-bois frais, sous-bois humide
Capacités de drainage du sol :	normal, bien drainé
Tolérance au calcaire actif :	calcifuge

Divers

Usages possibles :	acidophiles, potées
---------------------------	---------------------

Feuillage

Couleur des feuilles :	pourpre rouge
Type de feuillage :	caduc

Fleurs

Couleur des fleurs :	pourpre
Période de floraison :	06-juin, 04-avril, 05-mai

Morphologie

Hauteur :	3+m
Largeur :	3m
Port :	arrondi

Racines

Système racinaire :	superficiel
----------------------------	-------------

