

Rhus typhina



Arbuste 4 m. Forme peu à peu un parasol. Rameaux épais, vêtus d'une pubescence dense, brun roux. Grandes feuilles, jusque 50 cm, composées de grandes folioles lancéolées, vert foncé, orange à écarlate en automne. Fleurs jaunâtres en juin-juillet, en panicules terminales dressées, compactes, rouge amarante, de septembre jusqu'en hiver. Aime les sols frais et nutritifs mais résiste bien à la sécheresse. Craint le compactage. Isolé, groupe, bac.

Taxonomie

Nom français : Sumac de Virginie, Sumac amarante
Famille botanique : Anacardiaceae

Agronomie

Type de sol : frais
Exposition : plein soleil, soleil
Humidité du sol : sec, très sec, humide, frais
pH du sol : acide, neutre, basique
Rusticité : très rustique
Tolérance au calcaire actif : calcicole

Divers

Usages possibles : fruits décoratifs

Feuillage

Couleur des feuilles : vert
Type de feuillage : caduc

Fleurs

Couleur des fleurs : jaunâtre
Période de floraison : 07-juillet, 06-juin

Fruits

Couleur des fruits : rouge brun

Morphologie

Hauteur : 4+m
Largeur : 4m
Port : large

Racines

Système racinaire : drageons

