

Daboecia cantabrica 'Arielle'



Arbuste 0,40 m. Port étalé. Feuilles ovales, allongées. Fleurs en grosses clochettes disposées en grappes lâches, de juin à octobre. Sols acides, tourbeux et frais. Craint les grands froids, surtout en sol lourd et lorsque le vent conjugue son effet. Massif, rocaille, landes humides, complément de massif de rhododendrons. Feuillage vert bronze. Fleurs rouges.

Taxonomie

| | |
|----------------------------|---|
| Nom français : | Bruyère de saint Daboec Arielle, Bruyère irlandaise Arielle |
| Famille botanique : | Ericaceae |
| Obtenteur : | Kramer (DE) |
| Année d'obtention : | 1995 |

Agronomie

| | |
|--------------------------|---|
| Type de sol : | acide |
| Exposition : | mi-ombre, soleil |
| Humidité du sol : | frais, humide |
| pH du sol : | acide, très acide |
| Rusticité : | rustique |
| Milieus : | lande acide, lisière fraîche, lisière humide, plate-bande intensive |

Divers

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Usages possibles : | acidophiles, couvre-sol |
|---------------------------|-------------------------|

Feuillage

| | |
|-------------------------------|------------|
| Couleur des feuilles : | vert foncé |
| Type de feuillage : | persistant |

Fleurs

| | |
|-------------------------------|--|
| Couleur des fleurs : | rose foncé |
| Période de floraison : | 06-juin, 07-juillet, 08-août, 09-septembre, 10-octobre |

Morphologie

| | |
|---------------|-------|
| Port : | étalé |
|---------------|-------|

Racines

| | |
|----------------------------|-------------|
| Système racinaire : | superficiel |
|----------------------------|-------------|