

Caryopteris x clandonensis Summer Sorbet c.o.v.



1 m. Port compact. Feuillage marginé de jaune. Floraison bleu en septembre

Taxonomie

| | |
|------------------------------|--|
| Nom français : | Barbe bleue de Clandon Summer Sorbet |
| Famille botanique : | Lamiaceae |
| Obtenteur : | West End Nurseries (UK) |
| Année d'obtention : | 2002 |
| Éditeur / Diffuseur : | Globe Planter (FR), Ronald Houtman Sortimentsadvies (NL) |

Agronomie

| | |
|--|---|
| Type de sol : | ordinaire |
| Climat : | continental |
| Exposition : | plein soleil, soleil |
| Nature du sol : | argilo-sableuse, caillouteuse, limoneuse, limono-sableuse, ordinaire, sableuse |
| Richesse en matière organique : | riche, normale |
| Humidité du sol : | sec, frais |
| pH du sol : | acide, neutre, basique, très basique |
| Rusticité : | assez rustique |
| Milieus : | lisière sèche, plate-bande intensive, prairie fraîche, prairie sèche, steppe calcicole, talus |
| Capacités de drainage du sol : | bien drainé, filtrant |
| Tolérance au calcaire actif : | calcicole |

Divers

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Usages possibles : | rocailles, talus, potées |
|---------------------------|--------------------------|

Feuillage

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Couleur des feuilles : | vert et jaune |
| Type de feuillage : | caduc |

Fleurs

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Couleur des fleurs : | bleu violacé |
| Période de floraison : | 08-août, 09-septembre, 10-octobre |

Morphologie

| | |
|------------------|--------|
| Hauteur : | 1+m |
| Largeur : | 1,5m |
| Port : | dressé |

Racines

| | |
|----------------------------|----------|
| Système racinaire : | pivotant |
|----------------------------|----------|

