

Foeniculum vulgare



Feuillage : avant floraison, Graine : fin d'été H100/120cm. Parfume les salades et le court-bouillon destiné aux poissons. Le feuillage se récolte avant la floraison et les graines en fin d'été.

Taxonomie

Nom français : Fenouil commun, Fenouil vivace, Fenouil vert
Famille botanique : Apiaceae

Agronomie

Exposition : plein soleil, soleil
Nature du sol : argilo-limoneuse, argilo-sableuse, caillouteuse, limoneuse, limono-sableuse, argileuse
Richesse en matière organique : riche, faible, normale
Humidité du sol : frais, sec, très sec
pH du sol : acide, neutre, basique, très basique
Rusticité : rustique
Milieus : pied de mur, plate-bande intensive, prairie fraîche, prairie sèche, steppe calcicole, talus
Capacités de drainage du sol : lourd, normal, bien drainé, filtrant
Tolérance au calcaire actif : calcicole

Divers

Particularités : aromatique
Partie de plante intéressante (alimentaire) : racine
Usages possibles : aromatiques, comestibles, talus

Feuillage

Couleur des feuilles : vert
Type de feuillage : caduc

Fleurs

Couleur des fleurs : jaune
Période de floraison : 07-juillet, 08-août, 09-septembre

Fruits

Période de récolte : 07-juillet, 08-août, 09-septembre

Morphologie

Hauteur : 100 - 200 cm

Divers

Indigène : oui

