

Tanacetum vulgare



Juillet-Nov. 100cm. Plante vivace à feuilles vertes foncées, finement divisées. Capitules jaunes de juillet à septembre. Elle est utilisée depuis l'antiquité pour ses nombreuses propriétés. Réputée être un excellent tonique et stimulant, elle est aussi employée en cuisine pour son arôme fortement poivré.

Taxonomie

Nom français : Tanaisie commune, Barbotine, Tanacée, Herbe de Saint-Marc, Herbe amère, Herbe aux vers, Sent-bon, Tanaisie
Famille botanique : Asteraceae

Agronomie

Exposition : mi-ombre, plein soleil, soleil
Humidité du sol : frais, humide
pH du sol : acide, neutre, basique
Rusticité : très rustique
Milieus : berges, lisière fraîche, lisière humide, pied de mur, prairie fraîche, prairie humide, talus

Divers

Particularités : aromatique
Partie de plante intéressante (alimentaire) : toute

Feuillage

Couleur des feuilles : vert
Type de feuillage : caduc

Fleurs

Couleur des fleurs : jaune
Période de floraison : 06-juin, 07-juillet, 08-août, 09-septembre

Fruits

Période de récolte : 07-juillet, 08-août, 09-septembre, 10-octobre, 11-novembre

Morphologie

Hauteur : 100 cm

Divers

Indigène : oui