

Poirier 'Williams Rouge'



Identique à 'Williams', chair ferme, épiderme rouge.

Taxonomie

Nom français :	Poirier Williams Rouge amélioré clone Infel 2667
Synonymes des noms latins :	Pyrus communis 'Williams Rouge'
Famille botanique :	Rosaceae
Obtenteur :	INRAE (FR)

Conseils

Période de taille :	02-février, 03-mars, 12-décembre
Utilisation :	isolé, potager, verger

Agronomie

Type de sol :	riche, argileux, léger, perméable
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	plein soleil, soleil, mi-ombre
Nature du sol :	argileuse, argilo-limoneuse, argilo-sableuse, légère, limoneuse, perméable
Richesse en matière organique :	riche, très riche
Humidité du sol :	frais, sec
pH du sol :	acide, neutre, basique
Rusticité :	très rustique
Capacités de drainage du sol :	normal, bien drainé
Tolérance au calcaire actif :	faiblement tolérante, tolérante

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	croisée
Période de floraison :	04-avril, 05-mai

Fruits

Caractéristiques du fruit :	juteuse, parfumée, sucrée, chair fondante
Forme des fruits :	pyriforme
Période de récolte :	09-septembre
Taille des fruits :	gros
Utilisation (cuisine) :	cuit, table, tarte

Morphologie

Vitesse de croissance : moyenne
Port : arborescent, étalé, pyramidal

Racines

Système racinaire : pivotant, profond