

## Pommier 'Braeburn'



Fruitier. Maturité octobre, moyen, rouge brique, chair ferme, croquante et équilibrée.

### Taxonomie

<b>Nom français :</b>	Pommier Braeburn
<b>Synonymes des noms latins :</b>	Malus communis 'Braeburn'
<b>Famille botanique :</b>	Rosaceae

### Conseils

<b>Période de taille :</b>	02-février, 03-mars, 11-novembre
<b>Utilisation :</b>	verger

### Agronomie

<b>Type de sol :</b>	profond, léger, perméable, riche
<b>Climat :</b>	continental, maritime, méditerranéen
<b>Exposition :</b>	plein soleil, soleil
<b>Nature du sol :</b>	légère, perméable, profonde
<b>Richesse en matière organique :</b>	riche
<b>Humidité du sol :</b>	frais
<b>pH du sol :</b>	basique, acide, neutre
<b>Rusticité :</b>	très rustique

### Divers

<b>Usages possibles :</b>	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

### Feuillage

<b>Type de feuillage :</b>	caduc
----------------------------	-------

### Fleurs

<b>Pollinisation :</b>	autofertile
<b>Période de floraison :</b>	04-avril, 05-mai

### Fruits

<b>Caractéristiques du fruit :</b>	chair ferme et croquante
<b>Forme des fruits :</b>	rond
<b>Période de récolte :</b>	10-octobre
<b>Taille des fruits :</b>	moyen
<b>Utilisation (cuisine) :</b>	cuit, table, tarte

### Morphologie

<b>Vitesse de croissance :</b>	moyenne
<b>Port :</b>	arborescent, couronne arrondie, étalé

## Racines

**Système racinaire :** pivotant, superficiel