

Cassissier 'Noir de Bourgogne'



Baie très parfumée, floraison tardive, maturité début juillet.

Taxonomie

Nom français :	Cassissier Noir de Bourgogne
Synonymes des noms latins :	Ribes nigrum 'Noir de Bourgogne'
Famille botanique :	Grossulariaceae
Obtenteur :	(FR)

Conseils

Période de taille :	02-février
Utilisation :	haie, massif, potager

Agronomie

Type de sol :	tous
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	soleil, mi-ombre
Nature du sol :	tous types de sol
Humidité du sol :	frais, humide
pH du sol :	neutre, basique, acide
Rusticité :	très rustique
Tolérance au calcaire actif :	calcifuge

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	croisée
Période de floraison :	04-avril, 05-mai

Fruits

Caractéristiques du fruit :	baie ferme et très parfumée
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	07-juillet
Taille des fruits :	petit
Utilisation (cuisine) :	confiture, liqueur, variété ancienne

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
--------------------------------	---------

Port : touffe buissonnante

Racines

Système racinaire : fasciculé