

Cerisier bigarreau 'Marmotte'



Fruitier. Maturité mi-juin fin juin. Gros, vigoureux et fertile.

Taxonomie

Nom français :	Cerisier Marmotte
Synonymes des noms latins :	Prunus avium 'Marmotte'
Famille botanique :	Rosaceae

Conseils

Période de taille :	07-juillet, 08-août, 09-septembre
Utilisation :	isolé

Agronomie

Type de sol :	léger, drainé, riche, caillouteux
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	plein soleil, soleil
Nature du sol :	légère, caillouteuse, drainante
Richesse en matière organique :	riche
Humidité du sol :	frais
pH du sol :	acide, neutre, basique, très basique
Rusticité :	très rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	croisée
Période de floraison :	05-mai, 06-juin, 04-avril

Fruits

Caractéristiques du fruit :	chair ferme très sucrée
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	07-juillet
Taille des fruits :	gros
Utilisation (cuisine) :	table

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
Port :	arborescent, dressé, étalé

Racines

Système racinaire : étalé, superficiel