

Cerisier bigarreau 'Moreau'



Fruitier. Maturité fin mai-début juin, noir, très bons et gros.

Taxonomie

Nom français :	Cerisier Moreau
Synonymes des noms latins :	Prunus avium 'Moreau'
Famille botanique :	Rosaceae
Obtenteur :	Moreau (FR)
Année d'obtention :	1909

Conseils

Période de taille :	09-septembre, 07-juillet, 08-août
Utilisation :	verger

Agronomie

Type de sol :	profond, léger, drainé, riche
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	plein soleil, soleil
Nature du sol :	drainante, légère, profonde
Richesse en matière organique :	riche
Humidité du sol :	frais
pH du sol :	acide, neutre, basique, très basique
Rusticité :	très rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	croisée
Période de floraison :	04-avril, 05-mai, 06-juin

Fruits

Caractéristiques du fruit :	chair ferme et sucrée
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	07-juillet
Taille des fruits :	très gros
Utilisation (cuisine) :	table

Morphologie

Vitesse de croissance : moyenne
Port : arborescent, étalé

Racines

Système racinaire : étalé, superficiel