

Cerisier bigarreau 'Reverchon'



Fruitière. Maturité mi-juin fin juin. Très gros, foncé.

Taxonomie

| | |
|------------------------------------|---|
| Nom français : | Cerisier bigarreau Reverchon, Cerisier Cœur de Bœuf |
| Synonymes des noms latins : | Prunus avium 'Reverchon' |
| Famille botanique : | Rosaceae |

Conseils

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Période de taille : | 07-juillet, 08-août, 09-septembre |
| Utilisation : | isolé, massif, verger |

Agronomie

| | |
|--|--|
| Type de sol : | drainé, riche, léger |
| Climat : | continental, maritime, méditerranéen, montagnard |
| Exposition : | plein soleil, soleil |
| Nature du sol : | drainante, légère |
| Richesse en matière organique : | riche |
| Humidité du sol : | frais |
| pH du sol : | acide, neutre, basique, très basique |
| Rusticité : | très rustique |

Divers

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Usages possibles : | comestibles, fruitiers |
|---------------------------|------------------------|

Feuillage

| | |
|----------------------------|-------|
| Type de feuillage : | caduc |
|----------------------------|-------|

Fleurs

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Pollinisation : | croisée |
| Période de floraison : | 04-avril, 05-mai |

Fruits

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Caractéristiques du fruit : | chair ferme et sucrée |
| Forme des fruits : | rond |
| Période de récolte : | 06-juin |
| Taille des fruits : | très gros |
| Utilisation (cuisine) : | table |

Morphologie

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Vitesse de croissance : | moyenne |
| Port : | arborescent, dressé, étalé |

Racines

Système racinaire : étalé, superficiel