

Pêcher 'Redwing'



Fruitière. Maturité août, chair blanche, moyen, juteux, très bon, noyau libre.

Taxonomie

Synonymes des noms latins : Prunus persica 'Redwing'
Famille botanique : Rosaceae

Conseils

Période de taille : 01-janvier, 02-février, 11-novembre, 12-décembre
Utilisation : isolé, massif, verger

Agronomie

Type de sol : léger, drainé, riche
Climat : montagnard, continental, maritime, méditerranéen
Exposition : soleil
Nature du sol : drainante, légère
Richesse en matière organique : riche
pH du sol : neutre
Rusticité : rustique, assez rustique

Divers

Usages possibles : comestibles, fruitiers

Feuillage

Type de feuillage : caduc

Fleurs

Pollinisation : autofertile
Période de floraison : 04-avril

Fruits

Caractéristiques du fruit : chair blanche ferme, juteuse et parfumée
Forme des fruits : rond
Période de récolte : 08-août
Taille des fruits : moyen
Utilisation (cuisine) : compote, confiture, table

Morphologie

Vitesse de croissance : moyenne
Port : arborescent, étalé

Racines

Système racinaire : pivotant, profond

© Tous droits réservés. Données fournies par Plandanjou avec la collaboration de Plante et Cité. Document généré le 24/05/2026 19:00:53
PLANDANJOU SA · 10 esplanade Jean Sauvage 49130 LES PONTS-DE-CÉ (FRANCE) · Tél. +33 2 41 79 44 80 · info@plandanjou.com · www.plandanjou.com
RCS Angers B 310 679 311