

## Cerisier guigne 'Early Rivers'



Fruitier. Maturité fin mai-début juin. Fertile, vigoureux.

### Taxonomie

<b>Nom français :</b>	Cerisier Early River
<b>Synonymes des noms latins :</b>	Prunus avium 'Early Rivers'
<b>Famille botanique :</b>	Rosaceae

### Conseils

<b>Période de taille :</b>	07-juillet, 08-août, 09-septembre
<b>Utilisation :</b>	isolé

### Agronomie

<b>Type de sol :</b>	léger, drainé, riche, caillouteux
<b>Climat :</b>	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
<b>Exposition :</b>	plein soleil, soleil
<b>Nature du sol :</b>	caillouteuse, drainante, légère
<b>Richesse en matière organique :</b>	riche
<b>Humidité du sol :</b>	frais
<b>pH du sol :</b>	acide, neutre, basique, très basique
<b>Rusticité :</b>	très rustique

### Divers

<b>Usages possibles :</b>	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

### Feuillage

<b>Type de feuillage :</b>	caduc
----------------------------	-------

### Fleurs

<b>Pollinisation :</b>	croisée
<b>Période de floraison :</b>	04-avril, 05-mai

### Fruits

<b>Caractéristiques du fruit :</b>	chair juteuse et sucrée
<b>Forme des fruits :</b>	rond
<b>Période de récolte :</b>	06-juin
<b>Taille des fruits :</b>	gros
<b>Utilisation (cuisine) :</b>	pâtisserie

### Morphologie

<b>Vitesse de croissance :</b>	moyenne
<b>Port :</b>	dressé, étalé, arborescent

## Racines

**Système racinaire :** étalé, superficiel