

Cerisier bigarreau 'Tardif de Vignola'



Fruitière. Maturité juillet août. Gros, pourpre foncé, chair ferme.

Taxonomie

Nom français :	Cerisier Tardif de Vignola
Synonymes des noms latins :	Prunus avium 'Tardif de Vignola'
Famille botanique :	Rosaceae

Conseils

Période de taille :	07-juillet, 08-août, 09-septembre
Utilisation :	verger

Agronomie

Type de sol :	tous
Climat :	montagnard, continental, maritime, méditerranéen
Exposition :	plein soleil, soleil
Nature du sol :	tous types de sol
Humidité du sol :	frais
pH du sol :	neutre, basique, très basique
Rusticité :	très rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	croisée
Période de floraison :	04-avril, 05-mai, 06-juin

Fruits

Caractéristiques du fruit :	chair ferme
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	07-juillet
Taille des fruits :	gros
Utilisation (cuisine) :	table

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
Port :	arborescent, étalé

Racines

Système racinaire : étalé, superficiel