

Noisetier 'Cosford'



Fruitier. Fruit allongé, septembre.

Taxonomie

Nom français :	Noisetier commun Cosford, Noisetier Coxford, Noisetier Cosford
Synonymes des noms latins :	Corylus avellana 'Cosford'
Famille botanique :	Betulaceae
Obtenteur :	(UK)
Année d'obtention :	1876

Conseils

Période de taille :	02-février, 03-mars, 04-avril
Utilisation :	haie, isolé, massif, potager

Agronomie

Type de sol :	argileux, drainé, riche
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	mi-ombre
Nature du sol :	drainante, argileuse
Richesse en matière organique :	riche
pH du sol :	neutre
Rusticité :	très rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	croisée
Période de floraison :	02-février, 03-mars

Fruits

Caractéristiques du fruit :	parfumé et sucré
Forme des fruits :	allongé
Période de récolte :	09-septembre
Taille des fruits :	moyen
Utilisation (cuisine) :	variété ancienne

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
--------------------------------	---------

Port : dressé

Racines

Système racinaire : drageons, étalé, traçant