

Prunier 'Stanley'



Fruitier. Maturité fin août, gros, ovoïde, allongé, violet foncé, bon peu juteux, sucré.

Taxonomie

Nom français :	Prunier Stanley
Synonymes des noms latins :	Prunus domestica 'Stanley'
Famille botanique :	Rosaceae

Conseils

Période de taille :	09-septembre, 10-octobre, 11-novembre, 12-décembre
Utilisation :	isolé, massif

Agronomie

Type de sol :	riche, léger, drainé
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	soleil
Nature du sol :	drainante, légère
Richesse en matière organique :	riche
pH du sol :	neutre
Rusticité :	très rustique, rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	autofertile
Période de floraison :	04-avril

Fruits

Caractéristiques du fruit :	chair parfumée
Forme des fruits :	ovale
Période de récolte :	09-septembre
Taille des fruits :	gros
Utilisation (cuisine) :	conserves, séchée

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
Port :	arborescent, étalé

Racines

Système racinaire : superficiel, traçant, pivotant