

Pommier 'Belle Fille'



Fruitier. Maturité janvier, Jaune, lavé de rouge.

Taxonomie

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Nom français : | Pommier Belle fille de l'Indre |
| Synonymes des noms latins : | Malus communis 'Belle Fille' |
| Famille botanique : | Rosaceae |

Conseils

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Période de taille : | 02-février, 03-mars, 11-novembre |
| Utilisation : | isolé, verger |

Agronomie

| | |
|--|---|
| Type de sol : | perméable, riche, caillouteux, profond, argileux, léger |
| Climat : | maritime |
| Exposition : | soleil |
| Nature du sol : | argileuse, caillouteuse, légère, perméable, profonde |
| Richesse en matière organique : | riche |
| pH du sol : | acide, neutre, basique |
| Rusticité : | très rustique |

Divers

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Usages possibles : | fruitiers, comestibles |
|---------------------------|------------------------|

Feuillage

| | |
|----------------------------|-------|
| Type de feuillage : | caduc |
|----------------------------|-------|

Fleurs

| | |
|-------------------------------|----------|
| Pollinisation : | croisée |
| Période de floraison : | 04-avril |

Fruits

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Caractéristiques du fruit : | chair tendre et douce |
| Forme des fruits : | rond |
| Période de récolte : | 01-janvier |
| Taille des fruits : | moyen |
| Utilisation (cuisine) : | cuit, table, tarte |

Morphologie

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Vitesse de croissance : | moyenne |
| Port : | couronne arrondie, étalé, arborescent |

Racines

Système racinaire : pivotant, superficiel