

Pommier 'Fenouillet'



Fuitier. Maturité Janvier (Pomme d'anis), gris lavé de rouge sombre.

Taxonomie

Nom français :	Pommier Fenouillet
Synonymes des noms latins :	Malus communis 'Fenouillet'
Famille botanique :	Rosaceae

Conseils

Période de taille :	02-février, 03-mars, 11-novembre
Utilisation :	verger

Agronomie

Type de sol :	profond, argileux, léger, perméable, riche, caillouteux
Climat :	méditerranéen, continental, maritime
Exposition :	soleil
Nature du sol :	argileuse, caillouteuse, légère, perméable, profonde
Richesse en matière organique :	riche
pH du sol :	acide, neutre, basique
Rusticité :	très rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	croisée
Période de floraison :	04-avril

Fruits

Caractéristiques du fruit :	tendre, chair blanche, fine et croquante
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	01-janvier
Taille des fruits :	moyen
Utilisation (cuisine) :	table

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
Port :	arborescent, couronne arrondie, étalé

Racines

Système racinaire : pivotant, superficiel